

АМАРА́НТ

Авторы: Е. Э. Северова



Амарант.

АМАРА́НТ, щирица (*Amaranthus*), род преим. однолетних трав сем. амарантовых. Листья очередные, яйцевидные или удлинённые. Цветки, как правило, однополые, с редуцированным околоцветником, в сложных соцветиях. Плоды – мелкие орешки. Ок. 60 видов, распространённых в тёплых и умеренных поясах. Центр разнообразия А. – юго-запад США и Мексика. В России 20 видов, почти все заносные, рудеральные и сорные растения; наиболее часто встречается сорняк – А. запрокинутый (*A. retroflexus*), сопутствующий пропашным культурам. А. багряный (*A. cruentus*), А. хвостатый, или лисий хвост (*A. caudatus*), и некоторые др. виды с древности выращиваются как зерновые культуры (семена богаты белками) в Центр. и Юж. Америке, где они были гл. продуктом питания индейцев (до кукурузы) и играли важную роль в религ. обрядах. Благодаря

высокой питательности семян и простоте возделывания А. культивируются во мн. странах мира. В России весьма перспективным оказалось выращивание А. в качестве кормовых растений. Ряд видов, напр. А. синеватый (*A. lividus*) и А. трёхцветный (*A. tricolor*), – листовые овощные культуры Юж. и Вост. Азии; в России они разводятся в осн. любителями. Мн. сорта зерновых видов А. с крупными, ярко окрашенными соцветиями – декоративные растения.