



АРКТИ́ЧЕСКАЯ РА́СА

Авторы: А. П. Пестряков

АРКТИ́ЧЕСКАЯ РА́СА (эскимосская раса), малая раса в составе большой *[монголоидной расы](#)*. Распространена в циркумполярной зоне крайнего северо-востока Евразии (Камчатка, Чукотка), Сев. Америки (Аляска, Сев. Канада) и Гренландии (эскимосы, алеуты, чукчи, коряки, ительмены). Представляет собой переходный вариант между континентальными монголоидами внутр. территорий Азии (*[североазиатской расой](#)*), с одной стороны, и тихоокеанскими монголоидами Вост. Азии (*[дальневосточной расой](#)*) и *[американоидной расой](#)* – с другой. От североазиатских монголоидов представители А. р. отличаются более тёмной кожей, менее уплощённым и более prognathным лицом, нередко имеющим характерное пентагональное очертание благодаря большой ширине нижней челюсти, более высоким переносьем, большей толщиной слизистых губ, более обильной третичной обволошенностью лица, более долихоморфным типом сложения (относительно короче туловище и длиннее ноги), более развитой мускульной компонентой тела, у них реже встречается эпикантус. Часть этих признаков сближает А. р. с дальневосточной расой и, вероятно, указывает на её связи с населением прибрежных районов Юж. Китая.