

БЕКÁСЫ

Авторы: В. В. Иваницкий



Обыкновенный бекас.

БЕКÁСЫ (*Gallinago*), род куликов сем. бекасовых отр. ржанкообразных. Длина 25–31 см. Окраска покровительственная: сверху черновато-бурая с охристыми, рыжими и белыми пестринами, снизу беловатая с тёмными пятнами. Половой диморфизм не выражен. Клюв длинный, прямой; в его вершинной части имеются осязательные органы (многочисл. ячейки с окончаниями нервных волокон), помогающие находить корм при зондировании грунта. 16 видов, обитают в умеренных областях Старого и Нового Света. В России 6 видов, в т. ч. наиболее распространённый обыкновенный бекас (*G. gallinago*), дупель (*G. media*), лесной дупель

(*G. megala*). Населяют сырые, болотистые места с высокой травой, кочкарником и редким кустарником. Ведут скрытный образ жизни (за исключением периода размножения). Активны в сумерках; днём затаиваются в траве; при опасности убегают или внезапно взлетают. Основу рациона составляют почвенные беспозвоночные (черви, личинки насекомых и др.). Самцы большинства Б. весной токуют поодиночке в воздухе (дупели – группами на земле). Во время токового полёта птица набирает высоту и резко падает вниз с широко развёрнутым хвостом; при этом рулевые перья вибрируют под напором воздуха, издавая звук, напоминающий блеяние ягнёнка. Гнездом служит углубление в почве, обычно под прикрытием кочки. 4 грушевидных, охристых или зеленовато-серых, с черновато-бурыми пятнами и крапинками яйца самка высиживает 18–30 сут. Птенцы покидают гнездо в день вылупления, родители заботятся о них до приобретения способности к полёту. Б. – объект спортивной охоты. Японский Б. (*G. hardwickii*) в Красной книге РФ.