



БЕЛИЧЬИ

Авторы: Н. А. Щипанов

БЕЛИЧЬИ (Sciuridae), семейство отряда грызунов. Длина тела 6–60 см. Задние конечности пятипалые, обычно длиннее передних (четырёхпалых); когти острые. Хвост разной длины, густо покрыт волосами. Волосы густой и мягкий, относительно высокий или сильно изреженный, щетинковидный. Окраска разнообразная: одноцветная или с продольными полосами и пятнами, от чёрного и белого до рыжего и тёмно-грязно-жёлтого цвета. До 40 родов, более 230 видов (по количеству видов Б. уступают только сем. мышеобразных).

Распространены повсеместно за исключением Австралии, юж. части Юж. Америки, о. Мадагаскар, полярных областей. В России ок. 15 видов. Обитают в лесах, на открытых равнинах, в пустынях, в тундре и в горах до нижней кромки ледников. Ведут наземный (сурки, суслики, луговые собачки и др.), полудревесный (бурундуки) или древесный (белки) образ жизни; для некоторых Б. характерны дальние миграции. Одиночные или колониальные животные, большинство активны днём. Питаются разл. растениями, но могут включать в рацион значит. количество кормов животного происхождения; некоторые делают запасы. Представители ряда видов Б. впадают в зимнюю спячку. Размножаются 1–3 раза в год; беременность 22–45 дней, в каждом помёте 1–15 голых слепых детёнышей. Б. играют важную роль в природных экосистемах, особенно в степных сообществах, где они в значит. степени определяют состав и структуру растит. покрова. Ряд видов имеют промысловое значение. Среди Б. есть вредители с. х-ва, носители и распространители возбудителей особо опасных заболеваний человека, в т. ч. чумы (сурки, суслики) и клещевого энцефалита (белки, бурундуки).

Численность многих видов Б. значительно сократилась в связи с антропогенными изменениями ландшафтов. Более 70 видов Б. включены в Красную книгу МСОП, 2 – в Красную книгу РФ.