


БЕЛЬДЮГОВЫЕ

Авторы: А. Н. Котляр



Европейская бельдюга.

Рис. Е. Н. Федорченко

БЕЛЬДЮГОВЫЕ (Zoarcidae), семейство рыб отр. окунеобразных. Тело угревидное, длиной 15–20 см (у некоторых видов ок. 1 м). Кожа голая или покрыта мелкой неналегающей циклоидной чешуёй. Спинной и анальный плавники слиты с хвостовым. Плавательного пузыря нет. Живородящие или икремечущие. 46 родов, более 220 видов. Обитают в сев. частях Тихого и Атлантического океанов, в Антарктике и Субантарктике, встречаются в умеренных и тропич. водах; живут на глубине до 500 м, виды рода лиценхелов (*Lycenchelys*) – до 4 тыс. метров. Широко известна европейская бельдюга (*Zoarces viviparus*); её длина достигает 60 см. Половозрелость наступает на втором году жизни. Живородящая рыба, вымётывающая до 400 мальков. Продолжительность жизни ок. 9 лет. Встречается в Белом, Северном и Балтийском морях; может заходить в устья рек; живёт на глубине до 30 м среди камней и водорослей. Питается беспозвоночными, мелкой рыбой, икрой. Наиболее крупная (длина тела ок. 1 м, масса до 6 кг) – американская бельдюга (*Macrozoarces americanus*). Европейская и американская бельдюги – объекты местного промысла.