



БОЛÉТОВЫЕ ГРИБЫ́

Авторы: Л. В. Гарибова

БОЛÉТОВЫЕ ГРИБЫ́ (Boletaceae), семейство отдела базидиомицетов. Включает 415 видов (26 родов) шляпочных трубчатых грибов с мяскомясистыми плодовыми телами. Трубчатый слой у многих из них легко отделяется от мякоти шляпки. Споровый порошок буровато- или желтовато-зеленоватый. Большинство видов образуют *микоризу*, съедобны. Среди них *белый гриб* из крупнейшего рода этого семейства – *болетус*, подберёзовик обыкновенный (*Leccinum scabrum*), подосиновик красный (*L. aurantiacum*), редкий вид подосиновик белый (*L. percanthoides*) из рода *обабок*, моховик зелёный (*Xerocomus subtomentosus*), *польский гриб* и т. д.; несъедобные представители этого семейства – *жёлчный гриб*, или горчак (*Tylopilus felleus*), редкий вид шишкогриб хлопьеножковый (*Strobilomyces floccopus*) и др. Семейство Б. г. входит в одноим. порядок Boletales, включающий 18 семейств, 89 родов и 1025 видов. К этому порядку относится ряд известных и распространённых грибов: съедобные маслёнок настоящий, или жёлтый (*Suillus luteus*), маслёнок зернистый летний (*S. granulatus*), козляк (*S. bovinus*), несъедобный перечный гриб (*Chalciporus piperatus*) из сем. Suillaceae; редкие виды – гиропорус синеющий (*Gyroporus cyanescens*) и каштановый гриб (*G. castaneus*), входящие в сем. Gyroporaceae; мокрухи еловая (*Gomphidius glutinosus*) и пурпуровая (*G. rutilus*) из сем. мокруховые (*Gomphidiaceae*); несъедобная свинушка тонкая (*Paxillus involutus*) и съедобная свинушка толстая (*P. atrotomentosus*), подольшаник, или гиродон сизоватый (*Gyrodon lividus*) из сем. свинушковые (*Paxillaceae*).