



БОЛОТНЫЙ ОЛЁНЬ

Авторы: Н. А. Щипанов

БОЛОТНЫЙ ОЛЁНЬ (*Blastocerus dichotomus*), млекопитающее сем. оленьих. Единственный вид в одноимённом роде. Длина тела до 195 см, выс. до 120 см, масса до 150 кг. Волосной покров высокий и грубый, летом красновато-коричневый, зимой несколько темнее; нижняя часть ног чёрная. Рога многоветвистые, только у самцов. Ноги длинные, копыта могут широко раздвигаться, что позволяет животному легко передвигаться по болотам (отсюда название) и топким почвам. Обитает в вост. части Юж. Америки. Населяет заболоченные леса у ручьёв, рек и озёр. Даже при разливах рек не покидает поймы, живя по многу дней в воде. Держится поодиночке или небольшими группами (до 6 голов). Днём прячется в высокой траве, кустарниках или зарослях тростника; пасётся в сумерках или ночью. Кормится болотными и водными растениями. Гон, как и смена рогов, не приурочен к определённому сезону. Беременность 11–12 мес. Самка рождает 1 оленёнка, укрывшись на сухом месте. Б. о. угрожает опасность исчезновения из-за искусственного осушения мест его обитания и превращения их в с.-х. угодья. Внесён в Красную книгу МСОП.