

# БОЛЬШЕНО́ГИ

Авторы: В. В. Иваницкий



Кустарниковый большеног (*Alectura lathami*).

БОЛЬШЕНО́ГИ, сорные куры (*Megapodiidae*), семейство птиц отр. курообразных. Длина тела до 70 см, сложение плотное. Окраска б. ч. однородная, тёмно-серая с коричневыми оттенками, реже смоляно-чёрная с белым. Крылья широкие, тупые. Ноги большие (отсюда назв.), сильные; пальцы длинные с прямыми когтями, приспособлены к разгребанию грунта и растит. подстилки. Половой диморфизм не выражен. 7 родов, ок. 22 видов. Распространены в Индонезии, Полинезии, Австралии, на Новой Гвинее и Филиппинах. Населяют тропич. леса и заросли кустарников. Ведут наземный образ жизни; летают плохо и неохотно, быстро бегают. В рационе преобладает растит. пища. Б. известны благодаря уникальному среди птиц размножению. Яйца не насиживают. Самец лесных видов Б.

сгребает из земли и растит. опада большую кучу (до 11 м в диаметре и до 5 м в высоту), в которую самка откладывает с интервалом 4–8 дней яйца (до 30). Изменяя толщину верхнего слоя субстрата, самец поддерживает внутри кучи темп-ру (30–38 °С), которую определяет при помощи клюва. Некоторые виды Б. закапывают яйца в прибрежный песок, хорошо прогреваемый солнцем, другие пользуются вулканич. теплом. Продолжительность инкубации ок. 2 мес. Птенцы вылупляются вполне готовыми к самостоят. жизни; в конце первого дня они уже способны перепархивать на небольшие расстояния. Родители заботы о потомстве не проявляют. Мн. виды Б. находятся под угрозой истребления, внесены в Красную книгу МСОП.