

# БОРОДА́ТАЯ ЯЩЕРИЦА

Авторы: Н. Б. Ананьева



Бородатая ящерица.

БОРОДА́ТАЯ ЯЩЕРИЦА (*Pogona barbata*), пресмыкающееся сем. агам. Длина тела до 60 см. Туловище приплюснутое, хвост длинный. Голова широкая, на горле поперечная складка. Окраска сверху зеленовато-оливковая, голубоватая или желтоватая; при сильном испуге животное заметно светлеет. Своё назв. Б. я. получила за характерную защитную и устрашающую позу. Ящерица раздувает тело и горловую складку, раскрывает рот, так что видна жёлтая окраска полости рта (раздувание горла происходит при помощи удлинённых отростков подъязычной кости). При этом шиповатые чешуи вокруг уха, на темени, поперёк горла оттопыриваются в стороны, и в таком состоянии горловая складка напоминает жёсткую бороду (у самцов – чёрного цвета). По-видимому, эта поза служит также особям разных полов для опознавания друг друга в период размножения. Б. я. распространена в Австралии, в пустынных и

скалистых местностях. Питается насекомыми, мелкими позвоночными, цветками и сочными плодами. Самка откладывает яйца (9–24) в глубине выкопанной ею норы, после чего тщательно закрывает вход землёй.

Детёныши вылупляются спустя 3–3,5 месяца.