

# БОРЩЕВÍК

Авторы: М. Г. Пименов



Борщевик Сосновского.

БОРЩЕВÍК (*Heracleum*), род крупных трав сем. зонтичных. Стебель высотой до 2 м и более. Листья перисто- или тройчаторассечённые с широкими сегментами, реже простые. Цветки белые или розоватые, реже зеленовато-желтоватые, собраны в сложные зонтики, образующие щитковидное общее соцветие. Плоды – вислоплодники, распадающиеся на 2 сильно сжатые со спинки голые или опушённые части (мерикарпии). Ок. 120 видов, распространённых в Евразии, Африке и Сев. Америке. Гл. центры разнообразия – Кавказ и юго-зап. Китай. В России представители 21 вида встречаются на Сев. Кавказе, на остальной территории обычны Б. сибирский (*H. sibiricum*; Европ. часть России и Зап. Сибирь) и Б. рассечённый (*H. dissectum*; Сибирь и Дальний Восток). Мн. виды имеют хозяйств. значение как кормовые (силосные) растения, но почти все могут

вызывать у человека (при соприкосновении) воспаление кожи, похожее на ожог. В их числе и Б. Сосновского (*H. sosnovskyi*), завезённый с Кавказа, который культивировался как силосное растение, но стал опасным сорняком на лугах и опушках лесов мн. областей России и активно расширяет свой вторичный ареал. Некоторые виды Б., напр. Б. Мантегацци (*H. mantegazzianum*), – декоративны. Медоносы.