

БУРУНДУКІ

Авторы: Н. А. Щипанов



Азиатский бурундук.

БУРУНДУКІ (*Tamias*), род млекопитающих сем. беличьих. Длина тела 8–18 см, хвоста 6–14 см. Внешне напоминают белок. Окраска спины серовато-бурая, на спине пять тёмных продольных полосок. Хорошо развиты защёчные мешки. Ок. 18 видов. В Евразии 1 вид – азиатский Б. (*T. sibiricus*); обитает в лесах на северо-востоке Европы и в сев. части Азии. Остальные виды распространены в Сев. Америке от рек Юкон и Макензи до сев.-зап. штатов Мексики. В местах обитания Б. обычно многочисленны. Ведут наземный образ жизни; хорошо лазают по деревьям, совершают дальние прыжки с ветки на ветку. В рацион входят семена, плоды и вегетативные части растений, а также животная пища, гл. обр. насекомые и моллюски. Азиатские Б. собирают большие (до 3–4 кг) запасы отборных семян, в т. ч. сосны кедровой сибирской. Активны днём. Ведут одиночный образ жизни, охраняют индивидуальные территории. На зиму впадают в спячку. Самка за год приносит 1–2 помёта, до 9 детёнышей в каждом. Б. промыслового значения не имеют. Способствуют расселению ряда древесных пород. Участвуют в распространении ряда опасных заболеваний человека, в т. ч. клещевого энцефалита.