



БЮЛЬБЮЛЕВЫЕ

Авторы: В. В. Иваницкий



Короткопалый бюльбюль.

БЮЛЬБЮЛЕВЫЕ (бульбулевые), короткопалые дрозды (Pycnonotidae), семейство птиц отр. воробьинообразных. Длина тела 13–27 см. Окраска неяркая: верхняя сторона тела однотонная, буровато-зелёная или серовато-коричневая, низ белый, светло-серый или желтоватый. Для некоторых видов Б. характерны хорошо развитый хохолок на темени и светлые колечки вокруг глаз. Клюв относительно короткий, слегка изогнутый; в углах рта хорошо развиты жёсткие щетинки. Половой диморфизм не выражен. До 22 родов, ок. 120 видов. Распространены гл. обр. в тропич. и субтропич. областях Вост. полушария, за исключением

Австралии и Новой Гвинеи. В России на юге Сахалина и на о. Кунашир гнездится короткопалый бюльбюль (*Microscelis amaurotis*). Исключительно древесные птицы; населяют окраины лесов, рощи, группы деревьев и высоких кустарников среди полей, сады и парки; в горы поднимаются до выс. 3000 м. Большинство Б. кормится мелкими плодами, семенами; некоторые исключительно насекомоядны, остальные всеядны. Подвижные и крикливые птицы; песни некоторых видов Б. очень мелодичны. Большинство Б. моногамы, некоторым свойственна полигамия; вне периода размножения часто держатся стаями. Чашевидные ажурные гнёзда строят на кустах и деревьях. В кладке 2–3 (1–5) яйца. Местами Б. могут наносить ощутимый ущерб урожаям плодовых и ягодных культур.