



ВЕДДО́ИДНАЯ РА́СА

Авторы: А. П. Пестряков



Ведд с Шри-Ланки.

ВЕДДО́ИДНАЯ РА́СА, малая раса в составе большой [веддо-австралоидной расы](#). Характерны смуглая кожа (но более светлых оттенков, чем у представителей [австралоидной расы](#)); чёрные, обычно узковолнистые, реже прямые (вероятно, вследствие монголоидной примеси) волосы; обволошенность тела у мужчин малая или средняя; рост средний или малый (у мужчин-веддов – до 156 см), пропорции удлинённые; размеры головы и лица меньше, чем у австралоидов; лоб чаще прямой, надбровье развито слабо; верхняя губа средневысокая, типично сильное развитие слизистой оболочки губ.

В. р. встречается в качестве субстрата преим. в зап. части исходного ареала формирования веддо-австралоидной расы. В Сев. Индии элементы В. р. прослеживаются в осн. в виде примеси к доминирующей индо-средиземноморской европеоидной расе, в Южной – образуют территориальную мозаику с южноиндийской расой. Наиболее выражена В. р. у ряда народов Вост. Индии ([бирхоры](#), [гонды](#) и др.) и [веддоев](#) Шри-Ланки. К востоку от Индостана небольшие популяции ([кубу](#) на о. Суматра, возможно, отд. группы [чамов горных](#) в Индокитае) или отд. черты В. р. встречаются среди осн. массива южноазиатской расы. В древности В. р. была, вероятно, распространена также далеко к северу и западу (о наличии В. р. в Ср. Азии, в частности, свидетельствуют палеоантропологич. материалы некрополя г. Гонур в Вост. Туркмении).