

# ВИЛОРО́Г

Авторы: Н. А. Щипанов



Вилорог.

ВИЛОРО́Г (*Antilocapra americana*), млекопитающее сем. вилороговых отр. парнокопытных. Единственный совр. вид в семействе. Телосложение изящное; длина тела до 140 см, высота в холке до 105 см, масса до 64 кг; самцы крупнее самок. Морда удлинённая, глаза большие, с длинными ресницами. Рога у самцов вильчато разветвлённые (отсюда назв.) длиной до 25 см, у самок они меньше или отсутствуют. Рога имеют костное основание и роговой чехол, который ежегодно меняется. Окраска спины желтовато-коричневых тонов; брюхо и нижняя половина боков белые; у основания хвоста большое белое «зеркало». В. распространён в степях и полупустынях Сев. Америки. Активен круглосуточно. Питается разл. травами. Бегает со скоростью до 65 км/ч (на коротких дистанциях – до 95), являясь одним из наиболее быстрых млекопитающих. Летом В. держатся

небольшими группами, зимой объединяются в стада (до нескольких сотен голов). Во время гона самец собирает гарем до 15 самок. У самки обычно 2 детёныша. В. наряду с бизонами составляли основу существования индейцев. В 1880 поголовье В. превышало 40 млн. особей, к 1900 осталось ок. 19 тыс. голов. Во 2-й пол. 20 в. в результате мер по охране численность В. достигала нескольких сотен тысяч голов. Является объектом спортивной охоты. Продолжительность жизни на воле до 8–10 лет, в неволе выживает плохо.