



ВОРОБЬИ́

Авторы: В. В. Иваницкий



Домовый воробей.

Фото А. И. Нагаева

ВОРОБЬИ́, воробьиные (Passeridae), семейство птиц отр. воробьинообразных. Длина 10–18 см. В окраске оперения преобладают бурые, рыжие, серые и жёлтые тона, иногда с чёрными и белыми отметинами. У ряда видов выражен половой диморфизм. 6 родов, до 40 видов. Обитают в саваннах, степях, пустынях и горных районах Европы, Азии и Африки. Некоторые виды завезены в Америку, Австралию и Новую Зеландию. Многие представители В. связаны с человеком (см. ст. [Синантропные виды](#)). В России 7 видов. Наиболее широко распространены домовый (*Passer domesticus*) и полевой (*Passer montanus*) воробьи. Основу рациона взрослых В. составляют семена, птенцов

выкармливают главным образом насекомыми. Некоторые виды гнездятся колониями. Гнездо – шаровидная постройка из травы с боковым входом. Одни виды строят гнёзда на деревьях, другие – в закрытых убежищах: дуплах, расселинах скал, норах, под крышами строений и др. В кладке обычно 5–6 яиц. Насиживают 12–15 сут, птенцы остаются в гнезде 15–24 дня. Некоторые виды В. повреждают посевы зерновых; домовый воробей – опасный амбарный вредитель.