

ВОРОБЬИНООБРА́ЗНЫЕ

Авторы: В. В. Иваницкий



Воробьинообразные: 1 – малый зелёный рогоклюв (*Calypomena viridis*); 2 – индийская питта (*Pitta brachyura*); 3 – гвианский скальный петушок (*Rupicola rupicola*); 4 – ленточногруд...

ВОРОБЬИНООБРА́ЗНЫЕ (Passeriformes), отряд птиц. Преим. мелкие и ср. величины птицы; длина от 8 см (нектарницы) до 65 см (ворон), при массе соответственно от 3 г до 1,5 кг. Ок. 5500 видов (почти $\frac{2}{3}$ всех птиц мировой фауны). В. крайне разнообразны по внешнему виду, образу жизни, условиям обитания и способам питания. Напр., клюв может быть более или менее прямым (врановые), длинным и изогнутым (нектарницы), коротким и массивным (вьюрки, кардиналы) и т. д., а окраска – от невзрачной (пеночки, камышевки, жаворонки) до яркой (питты, котинги, райские птицы). Половой диморфизм проявляется в размерах, часто в окраске, у певчих птиц – в голосе (поют только самцы). В. делят на 4 подотряда: [рогоклювые](#), [примитивные воробьиные](#), [кричащие воробьиные](#) и [певчие воробьиные](#). Распространены В. по всему земному шару (отсутствуют только в Антарктике и на некоторых океанич. островах), наиболее разнообразны в тропич. лесах. В России обитают только представители подотряда певчих воробьиных – 28 семейств, 309 видов. Среди В. есть оседлые, кочующие и перелётные виды. Большинство В. ведут древесный образ жизни. Б. ч. моногамы; гнездятся обособленными

парами. Для ряда видов ткачиков, скворцов, трупияловых и врановых характерно колониальное гнездование. Все В. развиваются по птенцовому типу (птенцы вылупляются беспомощными, обычно слепыми, голыми или покрытыми редким пухом, долго находятся в гнезде; постоянная темп-ра тела у них устанавливается не сразу). В связи с этим В. отличаются тщательным строительством гнёзд разл. конструкций. Некоторые представители В. (воловьи птицы, вдовушки) являются гнездовыми паразитами. Число яиц в кладке варьирует от 1 у некоторых австралийских видов до 16 у синиц; у большинства В. в кладке 4–6 яиц. У мн. видов бывает две кладки и более в год, особенно в тропиках и субтропиках. Насиживают и выкармливают птенцов у большинства В. оба члена пары. Птенцы покидают гнездо в возрасте 11–45 дней. Вне периода гнездования В. часто образуют стайки. Большинство В. поедают насекомых, в т. ч. наносящих ущерб сельскому и лесному хозяйству; некоторые (напр., врановые) всеядные, есть растительноядные виды. Некоторые представители В. (дрозды, синицы, сойки, кедровки) способствуют распространению семян растений. Отдельные виды (воробьи, ткачики, трупиялы, скворцы и др.) могут повреждать посевы с.-х. культур. Более 1000 представителей В. внесены в Красную книгу МСОП, 10 видов в Красной книге РФ.