



# ВОРО́НЫ

Авторы: В. В. Иваницкий



Серая ворона.

Фото А. И. Нагаева

ВОРО́НЫ (*Corvus*), род птиц сем. врановых отр. воробьинообразных. Длина 40–65 см. В окраске оперения присутствуют чёрный, серый и белый цвета. Клюв прямой, крепкий. 39 видов. Космополиты (отсутствуют только в Новой Зеландии, Антарктиде и на мн. океанич. островах). Наиболее широко распространены два близких вида – серая В. (*C. cornix*) и чёрная В. (*C. corone*); иногда их считают подвидами одного вида *C. corone*. Чёрная В. населяет крайний запад Европы, Азию (к востоку от Енисея и частично Ср. Азию). На остальном пространстве Евразии и на северо-востоке Африки распространена серая В. В узких пограничных зонах их ареалов встречаются гибриды переходной окраски. В. населяют все типы

ландшафтов, в т. ч. антропогенные. Благодаря врождённым сложным формам поведения и умению приспосабливаться к разл. условиям среды серая В. становится всё более многочисленной в городах, где нередко образует большие скопления вместе с галками и грачами, особенно в местах зимних ночёвок. В. всеядны; в природной обстановке основу их рациона составляют беспозвоночные, мелкие грызуны, яйца и птенцы, ящерицы, лягушки, рыба, а также падаль. Вблизи жилья человека В. кормятся пищевыми отходами на помойках и свалках. Ведут оседлый образ жизни, образуя постоянные пары. Гнездятся на деревьях и скалах. Кладку из 5–6 яиц самка насиживает 18–21 сут. Птенцов кормят 4–5 недель оба родителя. Молодые нередко держатся с родителями вплоть до следующей весны. В. могут наносить существенный вред, разоряя гнёзда птиц (включая охотничьи виды), а также загрязняя здания.