



ГУАХА́РО

Авторы: В. М. Лоскот

ГУАХА́РО, жиряк (*Steatornis caripensis*), птица отр. козодоеобразных. Единственный представитель одноим. семейства (*Steatornithidae*). Длина до 45 см, масса ок. 400 г. Клюв сильный, с крючковатым надклювьем и зубцом на подклювье; в углах рта расположены длинные вибриссы. Оперение коричневое, с белыми округлыми пятнами и узкими черноватыми поперечными полосами. Размах крыльев до 1 м. Хвост длинный, ступенчатый, жёсткий. Лапы короткие, пальцы с цепкими когтями. Хорошо развито обоняние. Обитает в горных тропич. лесах на севере и в центре Юж. Америки, на о. Тринидад и др. скалистых прибрежных островах. Селится большими колониями глубоко в пещерах (до 1 км от входа). Для ориентации использует эхолокацию, издавая серии высокочастотных щёлкающих звуков. Питается ночью, срывая на лету плоды с деревьев (гл. обр. с пальм и представителей сем. лавровых); в поисках пищи может пролетать до 75 км. Светлое время суток Г. проводят в нишах, на карнизах и выступах стен пещер; здесь же они строят гнёзда из мякоти плодов и семян. Моногам. В кладке 2–4 яйца; насиживают оба родителя 33–35 сут. Птенцы остаются в гнезде 3,5–4 мес, накапливая к началу третьего месяца развития большое количество жира (до $\frac{1}{3}$ массы тела, отсюда второе назв.). Неумеренный промысел птенцов ради пищевого жира стал причиной сокращения численности вида. Г. внесён в Красную книгу МСОП; осн. места гнездования охраняются.