


ДОЛГОНО́СИКИ

Авторы: В. Ю. Савицкий



Долгоносики: 1 – свекловичный (*Bothynoderes punctiventris*); 2 – горошковый (*Hypera viciae*); 3 – серый многоядный (*Tanymecus palliatus*).

Фото К. В. Макарова

ДОЛГОНО́СИКИ, слоники (*Curculionidae*), самое крупное семейство жуков подотряда разноядных. Тело (длина 0,8–60 мм) разнообразной формы и окраски, часто покрыто волосками или чешуйками. Голова вытянута в головотрубку, оканчивающуюся грызущим ротовым аппаратом. Усики коленчатые, булавовидные. Исходя из строения головотрубки, Д. делят на короткохоботных и длиннохоботных. Личинки Д., развивающиеся в почве или тканях растений, белые, С-образно изогнуты, лишены ног; открыто живущие личинки (виды подсемейства *Hyperinae*) гусеницеобразные, окрашенные. Ок. 70 тыс. видов, в России ок. 3000. Распространены во всех природных зонах, кроме полярных пустынь, наиболее многочисленны в тропиках. Большинство Д. развиваются только на растениях, относящихся к определённым семействам, родам или видам.

Представители мн. родов Д. повреждают с.-х. культуры и лесные породы, напр. свекловичные долгоносики (*Bothynoderes*), скосари (*Otiorhynchus*),

фрочки (*Lixus*), листовые долгоносики (*Hypera*), плодожилы (*Curculio*), цветоеды (*Anthonomus*), смолёвки (*Pissodes*).