

# ЗМЕИНОШЕЙНЫЕ ЧЕРЕПА́ХИ

Авторы: Н. Н. Иорданский



Австралийская змеиношейная черепаха.

ЗМЕИНОШЕЙНЫЕ ЧЕРЕПА́ХИ (Chelidae), семейство бокошейных черепах. Характерна длинная шея (отсюда назв.), которая вместе с головой закладывается сбоку под панцирь, а не втягивается внутрь. У австралийской З. ч. (*Chelodina longicollis*) шея с головой по длине равна туловищу. Панцирь (длиной до 40 см) обычно значительно уплощён. Единственная группа совр. черепах, у которых сохранились носовые кости; сильно развита нижняя височная вырезка. В брюшном щите 9 костных пластинок, в спинном щите у большинства видов имеется непарный шейный щиток. У ряда видов З. ч. развиты дополнит. органы дыхания (анальные мешки). 10 родов, ок. 35 видов; распространены в Юж.

Америке, Австралии и на Новой Гвинее. Обитают в пресных водоёмах, хорошо плавают и ныряют. Питаются рыбой, лягушками, головастиками и водными беспозвоночными. Мясо и яйца некоторых видов З. ч. используются местным населением. Более 10 видов находятся под угрозой уничтожения, внесены в Красную книгу МСОП.