

# КАКАДУ́

Авторы: В. М. Лоскот



Розовый какаду.

Фото В. В. Климова

КАКАДУ́ (*Cacatuinae*), подсемейство попугаев. 6 родов, в т. ч. чёрный (*Probosciger*, 1 вид), траурный (*Calyptrorhynchus*, 5 видов), шлемоносный (*Calloscephalon*, 1 вид), розовый (*Eolophus*, 1 вид), настоящий (*Cacatua*, 12 видов) какаду, корелла (*Nymphicus*, 1 вид). Длина 29–69 см, масса от 80 г (корелла, *N. hollandicus*) до 1 кг (чёрный какаду, *P. aterrimus*). Для всех К. характерен подвижный хохол. У большинства видов клюв мощный, высокий; подклювье двумя зубцами охватывает надклювье снизу. Крылья широкие, закруглённые; хвост прямой, короткий или удлинённый. Кореллу от остальных К. отличают небольшой узкий клюв, острые крылья и длинный клиновидный хвост. Оперение белое, розовое, серое или чёрное, с красными, оранжевыми или жёлтыми отметинами, у ряда видов на голове имеются участки голой, ярко окрашенной кожи. К. населяют разл. типы лесов Австралии, Новой Гвинеи и прилежащих островов (от Филиппинских на севере до Тасмании на юге); в горах до выс. 2200 м. Летают относительно медленно. Питаются плодами (в т. ч. с очень прочной оболочкой), семенами, нектаром, почками и корешками, некоторые виды также насекомыми и их личинками. Гнездятся в дуплах деревьев или расщелинах скал. В кладке крупных видов 1–3 яйца (до 5), у кореллы 4–7 яиц. У большинства видов самец участвует в насиживании кладки. К. легко приручаются, способны имитировать человеческую речь и очень популярны среди любителей птиц. Изменение мест обитания и отлов привели к снижению численности мн. видов К. В Красную книгу МСОП внесены 7 видов К., 4 из них находятся под угрозой исчезновения, 2 вида – в критич. состоянии. Большие стаи розового К. (*E. roseicapilla*) могут приносить значит. вред сельскому хозяйству.