



# КАНЮКІ

Авторы: В. М. Лоскот



Обыкновенный канюк с птенцами на гнезде.

Фото И. И. Бышнева

КАНЮКІ́, сарычи (*Buteo*), род хищных птиц сем. ястребиных. Длина от 33–40 (дорожный канюк, *B. magnirostris*) до 72 см (мохноногий курганник, *B. hemilasius*); масса соответственно от 190 до 2050 г; самки крупнее самцов. Крылья и хвост обычно широкие. Клюв, ноги и когти средней величины; цевка, как правило, голая. Спина у большинства видов однотонная: бурая, чёрная, рыжая или серая; низ тела более светлый, пятнистый или с поперечными полосами, реже однотонный, белый, охристый или тёмный; молодые обычно окрашены более пёстро. Для ряда видов характерны тёмные морфы. Ок. 26 видов; 17 из них распространены в Зап. полушарии, остальные – в Евразии, Африке и на о. Мадагаскар; в горах (Тибет) – до выс. 4600 м. В России гнездятся 4

вида: [зИМНЯК](#) – в тундре и лесотундре; обыкновенный канюк (*B. buteo*) – в лесной и лесостепной зонах; курганник (*B. rufinus*) – в сухих степях и пустынях; мохноногий курганник – в горных степях Юго-Вост. Алтая и Забайкалья. Зимняк и обыкновенный канюк – перелётные виды. К. питаются небольшими наземными позвоночными (особенно грызунами), птицами, крупными членистоногими, едят также падаль и рыбу. Гнёзда строят на деревьях, скалах, обрывах или на земле. В кладке 1–7 (обычно 2–4) яиц; насиживают 21–35 сут оба родителя, реже только самка. Способность к полёту молодые приобретают в возрасте 30–60 дней. В Красную книгу РФ внесён курганник; в Красной книге МСОП 5 видов К.; гаитянский канюк (*B. ridgwayi*) находится в критич. положении.