

# КЕРЧАКОВЫЕ

Авторы: Ю. С. Решетников



Керчаковые. Пестрокрылая широколобка (*Batrachocottus multiradiatus*).

Рис. Е. Н. Федорченко

КЕРЧАКОВЫЕ, рогатковые (Cottidae), семейство рыб отряда скорпенообразных. Длина тела от 5–6 до 90 см; окраска буровато-зелёная или яркая с белыми, жёлтыми, оранжевыми, красными или чёрными пятнами и полосами. Тело обычно голое или частично покрыто костными пластинками, бляшками или шипиками. Голова большая, уплощённая, с шипами; рот крупный, чаще конечный. Передний спинной плавник всегда меньше заднего; в брюшном плавнике один колючий луч. Нижние лучи больших веерообразных грудных плавников утолщены и укорочены; опираясь ими на дно рыбы могут медленно передвигаться по грунту. Лучи

хвостового плавника ветвистые. Плавательного пузыря нет. Более 10 подсемейств, ок. 80 родов и почти 300 видов. Населяют пресные водоёмы ([желтокрылки](#), [подкаменщики](#) и [широколобки](#)), моря сев. части Атлантического и Тихого океанов, а также Сев. Ледовитый ок.; 1 вид – у берегов Новой Зеландии. Питаются донными беспозвоночными и рыбами (могут заглатывать добычу такой же длины, как и сам хищник); многие виды – хищники-засадчики, ведущие малоподвижный образ жизни. Промысловое значение имеют гл. обр. получешуйники (*Hemilepidotus*), [шлемоносцы](#), керчаки (*Myoxocephalus*).

Часть родов, относящихся к сем. К., выделяют в группу керчаки. К их числу относятся: морские рыбы гл. обр. родов керчаки (св. 10 видов), рогатые бычки (*Euphrys*), рогатки (*Trigloopsis*) и др. В Балтийском м., в сев. морях Европы обычен европейский керчак (*M. scorpius scorpius*, длина тела до 60 см; обитает преим. на глубине 25–60 м); в дальневосточных морях почти повсеместно встречаются керчак Стеллера (*M. stelleri*), многоиглый керчак (*M. polyacanthocephalus*, длина до 75 см), керчак-яок (*M. jaok*, длина до 60 см), бородавчатый керчак (*M. verrucosus*); в Японском м. обычен белопятнистый керчак (*M. brandtii*), а на литорали Командорских о-вов, п-ова Камчатка и Сев. Курильских о-вов живёт чёрный керчак (*M. niger*). Широко известен четырёхрогий бычок, или рогатка (*T. quadricornis*), – арктический циркумполярный вид, встречающийся в пресных водоёмах Канады, Скандинавского п-ова и России (в т. ч. в озёрах Ладожское, Онежское, в р. Нева). Повсеместно в дальневосточных морях живёт дальневосточная рогатка (*Megalocottus platycephalus*), которая заходит в устья рек.