

КЇВИ

Авторы: В. М. Лоскот



Бурый киви.

Maungatautari Ecological Island Trust

КЇВИ, бескрылы (*Apterygidae*), семейство нелетающих птиц отр. страусообразных (иногда его выделяют в отд. отряд). Населяют Новую Зеландию, в т. ч. о. Стьюарта и небольшие прибрежные острова. Единственный одноим. род – киви (*Apteryx*), 3 вида: бурый, или обыкновенный, киви (*A. australis*), большой пятнистый киви (*A. haastii*) и малый пятнистый киви (*A. owenii*); иногда видом считают также бурого киви с о. Северный (*A. a. mantelli*). Длина 35–55 см, масса от 880 г (малый пятнистый киви) до 3850 г (бурый киви); самки крупнее самцов. Голова и глаза маленькие, шея толстая, тело грушевидное, киль отсутствует, грудная мускулатура редуцирована, ноги мощные, мускулистые. Клюв тонкий, длинный (до 20 см), слегка загнутый книзу, ноздри открываются у

его вершины; на передней части головы много длинных осязательных щетинок. Крылья маленькие (4–5 см) с когтем на вершине, скрыты среди оперения; рулевые перья отсутствуют. Цевка толстая, 3 передних пальца хорошо развиты, с крупными когтями, задний – рудиментарный. Оперение бурое или серое, со светлыми пятнами; рассученные волосовидные перья равномерно покрывают тело. К. населяют вечнозелёные леса и заросли кустарников в субтропич. и умеренном поясах, в горах до выс. 1000 м. Питаются гл. обр. беспозвоночными (дождевыми червями, насекомыми, моллюсками), опавшими сочными плодами и семенами. Активны ночью; пищу находят с помощью обоняния, слуха и осязания. Моногамы, ведут строго территориальный образ жизни. Голос самца бурого К. – громкий свист «ки-ви» (отсюда назв.). Гнёзда устраивают в норах и естеств. нишах. Кладку из 1–2 (редко 3) очень крупных яиц (18–25% массы самки) насиживает преим. самец 63–92 сут. Выводковые птицы, птенцы выходят из гнезда в возрасте нескольких дней, кормятся самостоятельно. Часто К. используется как нац. символ Новой Зеландии. Все виды К. внесены в Красную книгу МСОП.