

КЛОПОГО́Н

Авторы: Л. И. Крупкина



Клопогон европейский.

Фото Jerzy Opiola

КЛОПОГО́Н (*Cimicifuga*), род многолетних корневищных трав сем. лютиковых. Стебли бороздчатые, выс. 50–200 см. Листья дважды-трижды тройчатые или перистые, голые или опушённые железистыми волосками, секрет которых придаёт растению неприятный запах. Цветки до 5 мм в диаметре, с простым околоцветником, собраны в многоцветковые серебристо-бело-кремовые верхушечные кисти или кистевидные метёлки; тычинки многочисленные с длинными, часто расширенными нитями. Плод из 2–8 листовок. До 18 видов во внетропич. областях Сев. полушария. В России 4 вида К. (даурский – *C. dahurica*, вонючий – *C. foetida*, борщевиколистный – *C. heracleifolia*, простой – *C. simplex*), произрастающие преим. в хвойно-широколиственных лесах Вост. Сибири и Дальнего Востока, а также изредка встречающийся в Европ. части одичавший в культуре К. европейский (*C. europaеа*). Среди К. лекарственные,

декоративные (в культуре с 18 в.) растения. Ранее К. вонючий использовался для борьбы с клопами (отсюда назв. рода) и др. насекомыми.