



# КОЛОНÓК

Авторы: Н. А. Щипанов



Колонок.

Фото В. В. Климова

КОЛОНÓК (*Mustela sibirica*), млекопитающее сем. куньих. Длина тела до 40 см, масса до 820 г; самцы крупнее самок. Тело стройное и гибкое, конечности короткие, хвост длинный (до 21 см), пушистый. Летом окраска однотонная, желтовато-рыжая; зимний мех заметно светлее, густой, мягкий и пушистый. Губы и подбородок белые; вокруг глаз и до конца носа кофейно-бурое пятно («маска»). Имеются анальные железы, секрет которых обладает резким запахом. К. распространён в Юго-Вост., Вост. и Центр. Азии. В России его ареал охватывает тайгу и отчасти лесостепи Сибири и Дальнего Востока, местами заходит за Полярный круг. С нач. 20 в. К. интенсивно расселяется на запад: в Республике Коми, Кировской, Нижегородской и Самарской областях, Татарстане. Предпочитает долины рек и ручьёв, заросшие древесно-кустарниковой растительностью. К. держится поодиночке. Активен гл. обр. вечером и ночью. Передвигается прыжками, хорошо лазает по деревьям и плавает. Убежища находит в дуплах поваленных деревьев, в пустотах под корнями, под кучами хвороста, в норах грызунов и др. Питается мышевидными грызунами, мелкими птицами, кедровыми орехами. Гон в апреле – мае, иногда до августа. В помёте 2–8 детёнышей. В местах совместного обитания со степным хорём даёт плодовые гибриды (тумаки). К. может наносить ущерб птицеводству. Объект пушного промысла. Из волос хвоста К. изготавливают кисти для живописи. Точные сведения о численности К. отсутствуют.