



# КОША́ЧЬИ ЗМЕ́И

Авторы: Н. Н. Иорданский

КОША́ЧЬИ ЗМЕ́И (*Telescopus*), род змей подсемейства ложных ужей сем. ужеобразных. Длина тела до 1,3 м. Голова отчётливо отграничена от шеи, покрыта крупными симметричными щитками. Туловище слегка сжато с боков. Зрачок вертикальный. Зубы на верхнечелюстной кости постепенно уменьшаются кзади; 2 самых задних зуба крупнее остальных, имеют бороздки для введения в добычу ядовитого секрета слюнных желёз. Для человека укус К. з. не опасен. 11 видов, распространены в Юж. Европе, Африке и Юго-Зап. Азии. В России (в Дагестане) встречается обыкновенная кошачья змея (*Telescopus fallax*). Длина до 1 м. Верхняя сторона тела серого или розоватого цвета; вдоль спинного хребта крупные тёмные пятна; брюхо более светлое с многочисл. тёмными крапинками. Обитает на каменистых склонах, остепнённых участках, реже на окраинах горных лесов, в горах до выс. 1800 м. В период жары активна в сумерках и ночью, в прочие сезоны встречается и днём. Хорошо лазает по деревьям, скалам и вертикальным стенам строений. Охотно селится в камышовых кровлях домов и в заброшенных жилищах. Питается гл. обр. ящерицами, реже мелкими грызунами и птицами. Самки откладывают в июне – июле 6–9 яиц. Детёныши выходят из яиц в сентябре. Один из представителей К. з. – *T. hoogstraali* находится под угрозой исчезновения, внесён в Красную книгу МСОП.