



КУЛИКИ́

Авторы: П. С. Томкович

КУЛИКИ́ (Charadrii), подотряд птиц отр. ржанкообразных. Длина от 11 см (песочник-крошка, *Callidris minutilla*) до 64 см (дальневосточный кроншнеп, *Numenius madagascariensis*), масса 19–1300 г. Телосложение стройное; шея часто удлинённая; крылья длинные узкие острые; хвост короткий. Клюв обычно длинный тонкий прямой, иногда загнут вниз, вверх или вбок (кривоклювый зуёк, *Anarhynchus frontalis*); уплощён с боков (кулики-сороки, *Haematorus*), лопатовидный (*кулик-лопатень*) или короткий с широким основанием (*тиркушки*). Ноги у большинства видов длинные; передние пальцы широко расставлены, задний палец маленький или отсутствует. В окраске оперения преобладают бурые, серые и белые тона, есть и яркоокрашенные виды. Обычно половые и сезонные изменения окраски незначительны.

Выделяют 11 семейств, 45 родов и ок. 215 видов; к наиболее крупным семействам относятся *ржанковые* (10 родов, 66 видов) и бекасовые (*Scolopacidae*, 23 рода, 92 вида). Распространены всесветно, залетают и в Антарктиду; в России встречаются 94 вида, 74 из них гнездятся. Многие населяют мор. побережья или берега внутри водоёмов, болота и низкотравные луга, др. предпочитают тундры, степи и пустыни, некоторые К. обитают в сырых лесах и альпийском поясе гор. Преим. наземные, хорошо бегающие и прекрасно летающие птицы. Оседлый образ жизни ведут немногие виды К., большинство широко кочует б. ч. года, для некоторых характерны дальние перелёты (напр., малый веретенник, *Limosa lapponica*). Питаются гл. обр. беспозвоночными (насекомыми, моллюсками, ракообразными, червями), реже семенами и ягодами. Большинство моногамы, встречаются и др. формы брачных отношений (полиандрия, полигиния). Обычны брачные полёты самцов или пары над своим участком, для некоторых (турухтан, дупель) характерно наземное групповое токование. Гнездятся на земле, редко на деревьях; в кладке 2–4 яйца; насиживают 17–40 (большинство 20–28) дней. Птенцы выводкового или полувыводкового типа развития. Мн. К. – объект спортивной охоты. Численность б. ч. видов К. сокращается; в Красную книгу МСОП внесены 42 вида, 5 из них вымерли, 5 находятся на грани исчезновения; в Красной книге РФ – 19 видов.