

КУМЖА

Авторы: Ю. С. Решетников



Кумжа.

КУМЖА (*Salmo trutta*), рыба из сем. лососёвых, ближайший родственник сёмги. Образует проходную и пресноводную жилую (форель) формы; последние живут в реках и озёрах. Длина тела проходной К. до 1 м, масса до 51 кг, жилой – 25–30 см (масса ок. 500 г). Тело покрыто тёмными пятнами; в реках окраска коричневатая на спине с серебристым оттенком на боках, в крупных озёрах и устьях рек – серебристая. К. обитает

в бассейнах морей, омывающих побережье Европы. В России – в бассейнах Балтийского, Баренцева (до Чёшской губы), Белого, Чёрного и Каспийского морей; многочисленна на Кольском п-ове и в Карелии. К. образует неск. подвидов, в России – 3: обыкновенная К. (*S. t. trutta*), черноморская К. (*S. t. labrax*) и предкавказская К. (*S. t. ciscaucasicus*); у первых двух есть пресноводные формы. Эйзенамская форель (*S. eizenami*) из оз. Эйзенам (Кезеной-Ам, Сев. Кавказ) выделена в самостоят. вид. Проходная К. 2–3 года нагуливается в море; питается (в т. ч. в реках) рыбой и ракообразными; мелкие особи форели кормятся беспозвоночными, крупные – рыбой. Икрометание в течение жизни (19–20 лет) от 4 до 11 раз. Нерест с октября по ноябрь в верхнем и среднем течении рек. Икру (3–30 тыс. штук) откладывает в гнёзда на галечном грунте. Первые годы жизни проводит в реках, затем скатывается в море. Ценный промысловый вид; объект спортивного рыболовства и рыбоводства (акклиматизирован в т. ч. в Америке). У всех рос. подвидов резко сократилась численность; они внесены в Красную книгу РФ.