

# КУННИНГÁМИЯ

Авторы: С. А. Баландин



Куннингамия: побег с шишками.

КУННИНГÁМИЯ (*Cunninghamia*), род вечнозелёных голосеменных деревьев сем. таксодиевых. Назван в честь брит. воен.-мор. врача Дж. Каннингема, впервые обнаружившего К. в Китае (1702). Единственный полиморфный вид – К. ланцетная (*C. lanceolata*), распространённая в Китае (в районах с умеренным климатом), в Лаосе, Сев. Вьетнаме, возможно в Камбодже.

Вечнозелёное однодомное дерево (выс. до 50 м, диаметр до 3 м) с прямым стройным стволом и узкопирамидальной кроной, начинающейся почти от земли. Кора тёмно-серо-коричневая или красновато-коричневая, продольно-трещиноватая, неравномерно отслаивающаяся полосками. Ветви расположены мутовчато или в очередном порядке, листья –

спирально; последние ярко-зелёные, линейно-ланцетные, блестящие, более или менее серповидно-изогнутые, с мелкопильчатými краями и суженными основаниями. Мужские шишки (микростробилы) узкоовально-конические, женские (мегастробилы) – округло-яйцевидные; в верхушечных пучках чаще по 1–5 мужских шишек, женских – 1–4. Семенные чешуи несут на верхней стороне по 3 плоских, тёмно-коричневых, удлинённо-яйцевидных, с 2 боковыми крыльями семени. К. образует чистые или смешанные леса (с участием вечнозелёных пород сем. лавровых) на выс. 1000–3600 м. Древесина мягкая, лёгкая, ароматная, устойчивая к гниению, не поедается термитами, легко обрабатывается и используется для строительства и изготовления столярных изделий. Декоративная быстрорастущая порода. Издавна применяется для озеленения городов; в России разводится в парках г. Сочи.

## Литература

Лит.: Liguó Fú, Yǒngfú Yú, Mill R. R. *Cunninghamia* // *Flora of China*. St. Louis; Beijing, 1999. Vol. 4.