



ЛАБРАДОР

Авторы: М. Г. Деев

ЛАБРАДОР (Labrador, от португ. *lavrador* – земледelec, пахарь), окраинное море Атлантического ок. между п-овом Лабрадор и юж. оконечностью о. Гренландия. Сев. граница Л. с Девисовым прол. проведена по параллели 60° с. ш., юго-вост. граница с Атлантическим ок. – от мыса Фарвель (юж. оконечность Гренландии) по дуге большого круга до мыса Сент-Франсис (юго-восток о. Ньюфаундленд), юго-зап. граница образована побережьями п-ова Лабрадор и о. Ньюфаундленд. В этих границах пл. 841 тыс. км², объём 1596 тыс. км³. Наибольшая глубина 4316 м (58°10′ с. ш., 53°05′ з. д.).

Берега п-ова Лабрадор и о. Ньюфаундленд – фьордовые, сильно изрезанные, со множеством мелких островов и удобных бухт. Мелководные шельфовые районы с глубинами менее 200 м занимают 22% дна, его б. ч. занята Лабрадорской котловиной с Северо-Западным срединным атлант. каньоном в центре, глубины более 2 км прослеживаются на 55% площади дна. Донные осадки представлены глобигериновыми илами с включением терригенных материалов ледового разноса (в осн. моренных, приносимых мор. льдами).

Климат изменяется от морского на юго-вост. границе моря до сурового континентального в сев.-зап. районах. Темп-ра воздуха понижается с юго-востока на северо-запад: в феврале от –2 до –18 °С, в августе соответственно от 12 до 6 °С. Количество осадков в ср. ок. 1500 мм в год, наибольшее (до 1900 мм) выпадает у берегов Ньюфаундленда, наименьшее – на северо-западе (менее 1000 мм).

Вдоль юго-зап. берегов Гренландии по окраине моря с юга на север следует тёплое поверхностное *Западно-Гренландское течение*. Вдоль берегов п-ова Лабрадор и о. Ньюфаундленд проходит на юг холодное *Лабрадорское течение*. Полоса молодого льда появляется в октябре на северо-западе моря, а в декабре достигает берегов Ньюфаундленда; наибольшее развитие ледового покрова наблюдается в марте – апреле, лёд полностью разрушается в конце июля. Полностью море никогда не замерзает. Темп-ра воды на поверхности в феврале от –1,7 °С в полосе Лабрадорского течения до 4 °С в юго-вост. районе; в августе – соответственно от 2 до 10 °С. Солёность мало изменяется от сезона к сезону и в ср. составляет 31,5‰ в прибрежной полосе и 34,5‰ на границе с Атлантическим ок. Приливы полусуточные, высота прилива у юго-зап. берегов 1,7–2,1 м, у мыса Фарвель до 5 м.