

ЛУТО́К

Авторы: В. М. Лоскот



Луток.

Фото Barbara Velthuysen

ЛУТО́К (*Mergellus albellus*), птица сем. утиных. Единственный вид в одном роде, который нередко объединяют с *крохальми*. Телосложение компактное; длина 35–44 см, масса 500–950 г; самцы несколько крупнее самок. Клюв относительно короткий, серый, с роговыми зубцами по краям челюстей. На темени и затылке небольшой хохол. Самец весной чёрно-белый, с тёмным струйчатым рисунком из поперечных полос на светло-серых боках. Самки, молодые и самцы осенью преим. серые, с белым брюшком и двуцветной головой – тёмно-коричневой сверху и белой снизу. Л. гнездится гл. обр. в таёжной зоне Евразии, местами также в лесотундре и лесостепи Сибири. Селится близ лесных озёр и рек с холодной,

прозрачной водой и медленным течением. Зимует на море у побережий и на внутр. незамерзающих водоёмах, расположенных южнее области гнездования (обычно севернее 30°с. ш.). Летом в рационе преобладают водные беспозвоночные, особенно насекомые, зимой и весной – мелкая рыба. За добычей птица может нырять на глубину 1–4 м, задерживается под водой до 45 с. Гнездится в дуплах, иногда в нишах среди камней или под корнями. Для гнёзд Л. характерен валик из светлого пуха. В кладке 5–11 (обычно 7–9) яиц; насиживает самка 26–28 дней. Молодые особи приобретают способность к полёту в возрасте 65–70 дней.