

ЛЮРИК

Авторы: В. М. Лоскот



Люрики.

Фото Helge Sörensen

ЛЮРИК (*Alle alle*), птица семейства чистиковых отр. ржанкообразных. Единственный вид в одноим. роде. Длина 17–20 см, масса 140–190 г. Голова относительно крупная, клюв и шея короткие. У взрослых птиц летом верхняя сторона, голова, шея и передняя часть груди чёрные, остальной низ белый; характерны небольшое белое пятно перед глазом и белые отметины на крыльях; зимой весь низ белый. Окраска молодых похожа на летнюю окраску взрослых особей, но менее яркая. Л. гнездится севернее 60° с. ш., на островах Сев. Атлантики и арктич. морей (от о. Элсмир и Гренландии на западе до Сев. Земли на востоке), возможно, также на севере Берингова моря. Зимой концентрируется на незамерзающих участках морей, иногда откочёвывает к югу до 40° с. ш. Основу питания Л.

составляют планктонные ракообразные; поедают также мальков рыб, кольчатых червей и моллюсков. Обычно протяжённость кормовых полётов не превышает 10 км от берега, но может достигать 100–150 км. За добычей птицы ныряют на глубину до 30 м. На суше передвигается неуклюже. Селится колониями (от нескольких десятков до сотен тысяч пар) обычно на каменистых осыпях. Единственное яйцо самка откладывает в нише среди камней или в скальной трещине (на глубине 0,5–1,0 м) на подстилку из плоских камешков, лишайников и стеблей трав. Насиживают (28–31 день) и кормят птенца (27–30 дней) оба родителя; добычу (до 3 тыс. рачков) приносят в подъязычных мешках. Благодаря многочисленности, Л. относится к осн. потребителям зоопланктона, играя существенную роль в экосистемах некоторых сев. морей.