



ЛЯГУШКОЗУ́БЫ

Авторы: Н. Н. Иорданский

ЛЯГУШКОЗУ́БЫ (*Ranodon*), род хвостатых земноводных сем. углозубых. Длина тела до 25 см; хвост превышает половину длины тела, сжат с боков, на спинной стороне несёт хорошо развитую плавниковую складку. Голова широкая, уплощённая; нёбные зубы образуют пару коротких поперечных рядов, как и сошниковые зубы у лягушек (отсюда назв.). По бокам тела 11–13 поперечных бороздок. Передние конечности четырёхпалые, задние – пятипалые. Окраска тёмно-оливковая или бурая с тёмными пятнами. 3 вида, 2 из которых распространены в горах Юго-Вост. Китая; семиреченский Л. (*R. sibiricus*) – эндемик гор Джунгарского Алатау (Тянь-Шань). Л. обитают на выс. 1800–2500 м в мелких горных ручьях с каменистым дном, с темп-рой воды 6–19 °С. Активны вечером и в первой половине ночи. Питаются водными беспозвоночными, в первую очередь личинками ручейников и бокоплавами. Икрометание происходит в апреле – августе. Самцы прикрепляют к разл. подводным предметам [сперматофоры](#), к которым самки приклеивают икряные мешки (50–100 яиц). Личинки перезимовывают в водоёмах и метаморфизируют лишь к концу следующего лета или даже на третий год жизни. Семиреченский Л. включён в Красную книгу МСОП.