


ЛЯДВЕНЕЦ

Авторы: Г. П. Яковлев



Лядвенец рогатый.

ЛЯДВЕНЕЦ (*Lotus*), род растений сем. бобовых. Преим. многолетние травы, полукустарники и кустарники. Листья непарно-перистосложные. Цветки разнообразной окраски, обычно в зонтиковидно-головчатых соцветиях; лодочка на верхушке клювовидно оттянута, 9 из 10 различных по длине тычинок спаяны в трубку. Плоды – многосемянные бобы, вскрывающиеся 2 створками. Ок. 125 видов произрастают в Евразии (от Зап. Европы до Вост. Азии), некоторое число видов – в Африке, Австралии и Океании. Центр видového разнообразия – Средиземноморье. Распространены преим. в умеренной зоне, реже в горах субтропич. и тропич. зон Вост. полушария. В России ок. 22 видов, растут на лугах, в луговых степях, в светлых лесах, придорожных полосах и насыпях. Многие из них – кормовые растения. 2 многолетних травянистых вида – Л. рогатый

(*L. corniculatus*) и Л. топяной (*L. uliginosus*) – культивируют как пастбищные и сенокосные растения. Поедаются всеми с.-х. животными до цветения (свежие цветки содержат горький ядовитый гликозид, в сене и силосе ядовитые свойства исчезают). Л. Бертолле (*L. bertholetii*) и Л. крапчатый (*L. maculatus*) – красноцветковые стелющиеся растения с Канарских о-вов и о-вов Зелёного Мыса в Зап. Европе выращивают как декоративные.