



МА́КВИ́С

Авторы: Р. В. Камелин

МА́КВИ́С (франц. maquis – чаща), тип растительности, возникший в Средиземноморье (от Португалии и Марокко до Юж. Турции и Палестины) в результате многовекового сведения жестколистных (реже – лавролистных) лесов. Представляет собой густые, иногда непроходимые заросли невысоких вечнозелёных деревьев и часто колючих кустарников. В М. господствуют многоствольные кустовидные формы каменного и колючего кермесового дубов (*Quercus ilex*, *Q. coccifera*), с которыми сочетаются деревца земляничного дерева (*Arbutus unedo*, *A. andrachne*), мастичной и терпентинной фисташки (*Pistacia lentiscus*, *P. terebinthus*), филлиреи (*Phyllirea latifolia*, *Ph. angustifolia*), а также вечнозелёные кустарники – мирт (*Myrtus communis*), древовидный вереск (*Erica arborea*), жёстер (*Rhamnus alaternus*), пираканта (*Pyracantha coccinea*), жасмин (*Jasminum fruticans*), розмарин (*Rosmarinus officinalis*), почти безлистный метельчатый дрок (*Sparthium junceum*), полулистопадные виды ладанника (*Cistus incanum*, *C. salvifolius* и др.), красноплодные виды можжевельника (*Juniperus oxycedrus*, *J. phoenicea*) и др. В нижних ярусах М. легко сочетаются тенелюбивые и светолюбивые виды трав, многие из которых цветут и зимой, и ранней весной, и осенью. Иногда М. называют типы растительности в др. районах Земли, где климат близок к средиземноморскому, – чапараль в Калифорнии, финбош на юге Африки, эспиналь в Чили. В отличие от М., образовавшегося в результате деятельности человека (вторичное происхождение), подобные типы растительности имеют первичное происхождение. При сведении самих сообществ М. в Зап. Средиземноморье на их месте возникают сообщества ещё одного типа растительности – гариги, где господствуют только низкие кустарники и кустарнички. В годы нем. оккупации партизан франц. Сопротивления называли «маки», т. к. их базы чаще всего располагались в М.