

ЛОЖНЫЕ ПОДКОВОНОСЫ

Авторы: С. В. Крусков



Хохлатый ложный подковонос
(*Hipposideros galeritus*).

Фото А. В. Борисенко

ЛОЖНЫЕ ПОДКОВОНОСЫ, листоносы Старого Света, подковогубы (*Hipposideridae*), семейство летучих мышей, близкородственное [подковоносам](#). Размеры от мелких до относительно крупных: длина тела 35–110 мм, масса 4–180 г. Хвост тонкий (длина до 6 см), целиком заключён в развитую хвостовую перепонку, в состоянии покоя загибается вверх; иногда отсутствует. На конце морды имеются кожные образования, расположенные вокруг и позади ноздрей; различают передний листок (подкову), средний листок и задний листок, который у Л. п. имеет форму поперечного валика либо трезубца; у некоторых видов могут формироваться дополнит. листки. Ушные раковины тонкие, без козелка, но обычно с выраженным противокозелком. Пальцы задних конечностей имеют по 2 фаланги. 10 родов, ок. 85 видов. Распространены в тёплых климатич. зонах Вост. полушария от Африки и Зап. Азии до Японии, Новой Гвинеи и Австралии. Населяют разл. типы лесов, редколесья и саванны. Светлое время суток проводят в дуплах, пещерах, гротах, норах крупных грызунов, постройках человека. Образуют колонии от нескольких десятков до тысяч особей, иногда совместно с др. видами рукокрылых. Питаются гл. обр. насекомыми.