

ГАЙЧКИ

Авторы: В. М. Лоскот



Черноголовая гайчка.

ГАЙЧКИ, общее название 14 видов синиц рода *Parus* (подрод *Parus*) сем. синицевых. Длина 11–14 см, масса 7–19 г; самки несколько мельче самцов. Крылья и хвост тёмно-бурые; спина серая, бурая или красновато-коричневая; бока белые, охристые, редко серые; низ тела белый или охристый. Для Г. характерно сочетание чёрной или коричневой «шапочки», обычно белых «щёк» и чёрного или тёмно-бурого треугольного пятна на подбородке и горле. Клюв небольшой, конический, острый. Ноги и пальцы короткие, сильные. Г. населяют леса Евразии, Сев. и Центр. Америки. В России широко распространены буроголовая Г., или пухляк (*Parus*

montanus), черноголовая, или болотная (*P. palustris*), и сероголовая (*P. cinctus*) гайчки. Питаются Г. членистоногими (в т. ч. многими вредными насекомыми), ягодами и семенами. Оседлы, но в годы неурожая шишек хвойных деревьев могут совершать массовые перемещения. Моногамы. Гнёзда устраивают в дуплах или трещинах скал. У большинства видов оба члена пары выдалбливают ретортовидное дупло в прогнивших стволах деревьев или пнях. В кладке 3–12 (обычно 4–8) яиц, которые самка насиживает 11–14 сут. Птенцы покидают гнездо через 16–21 сут, ещё 3–4 нед выводок держится вместе с родителями.