



ГОЛУБИ́НЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот

ГОЛУБИ́НЫЕ (Columbidae), семейство птиц отр. голубеобразных. Размеры небольшие или средние: длина 17–80 см, масса 0,3–2,5 кг. Телосложение плотное, голова маленькая, шея короткая. Обычно самцы несколько крупнее самок, у ряда видов они ярче или иначе окрашены. Окраска от светло-серой или бурой до очень яркой жёлтой, зелёной, синей и пурпурной. Для оперения многих Г. характерен сложный рисунок, включающий блестящие белые или чёрные пятна на шее, груди, крыльях и хвосте. Они играют роль видовых маркёров, особенно в брачных ритуалах, обычно сопровождаемых громкими звуками. Клюв, как правило, небольшой, тонкий, с твёрдой вершиной и гибким основанием; узкие ноздри прикрыты голой восковицей. Контурное оперение густое, перья с хорошо развитым пуховым основанием, слабо закреплены в тонкой коже и легко выпадают. Крылья варьируют от коротких, широких и закруглённых до удлинённых и острых. Хвост разл. длины, прямой, закруглённый или острый; 12–14 (редко 16–18) рулевых перьев. Хорошо развиты зоб и мускульный желудок. Копчиковая железа небольшая, неоперённая; у некоторых видов отсутствует.

42 рода Г. объединены в 5 подсемейств: типичные голуби (Columbinae, 29 родов, 180 видов), фазаньи голуби (Otidipharinae, 1 род, 1 вид), венценосные голуби (Gourinae, 1 род, 3 вида), зубчатоклювые голуби (Didunculinae, 1 род, 1 вид) и плодоядные голуби (Treroninae, 10 родов, 123 вида). Широко распространены лишь представители первого подсемейства, ареалы остальных Г. ограничены тропич. и субтропич. поясами Старого Света. В России гнездятся: 4 вида голубей (*вяхирь*, *клинтух*, сизый и скальный – *Columba rupestris*), 4 вида *горлиц* рода *Streptopelia*, а также японский зелёный голубь (*Treron sieboldii*); залетают бурый голубь (*C. evermanni*) и короткохвостая горлица (*S. tranquebarica*). Дикий сизый голубь стал преим. синантропным видом и расселился с человеком почти по всему земному шару; от него происходят многочисл. породы домашних голубей. Активны гл. обр. днём. В рационе Г. преобладает растит. пища (семена, фрукты, ягоды, цветы и молодые листья); поедают также мелких беспозвоночных. Кормятся на земле и в кронах деревьев. Регулярно посещают водопои, иногда пролетая значит. расстояния; пьют, не поднимая голову и всасывая воду через клюв. Моногамы; гнездятся гл. обр. одиночно. Простые гнёзда в виде платформы строят на деревьях, кустах или в дуплах, а также на земле, скалах и постройках. В году 2–3 (до 5) кладок; в кладке обычно 2 яйца (иногда 1); насиживают самка и самец 14–18 (до 30) сут. Родители кормят птенцов в гнезде 14–30 сут (редко до 3 мес). Первые 8–12 дней быстрый рост птенцов обеспечивают специальные, похожие на творог выделения слизистой оболочки зоба родителей (т. н. птичье молоко), позднее их заменяют размячённые в зобу растит. корма.

7 видов Г. вымерли гл. обр. по вине человека, в т. ч. *странствующий голубь*. 9 видов находятся под угрозой исчезновения. Более 90 видов и подвидов охраняются. Мн. виды Г. являются объектами спортивной охоты.