

ГОРБА́ТКИ

Авторы: Д. Ю. Тишечкин, Г. В. Фарафонова, В. Ю. Савицкий



Горбатки семейства цикадовых из родов *Membracis* (1) и *Umbonia* (2).

Фото Д. Ю. Тишечкина



Жуки горбатки: 1 – перевязанная горбатка (*Variimorda fasciata*); 2 – чёрная горбатка (*Mordella holomelaena*).

Фото В. Ю. Савицкого

ГОРБА́ТКИ, 1) (*Membracidae*), семейство цикадовых. Длина тела 3–10 мм (у тропич. видов до 15–20 мм). Переднеспинка сильно развита, образует разнообразные выросты, сопоставимые по размерам с телом, нередко весьма причудливой формы (отсюда назв.). Более 3000 видов, наиболее разнообразны в тропиках Центр. и Юж. Америки; в России 12 видов, преим. обитающих на Дальнем Востоке. Живут открыто на растениях. Завезённая из Сев. Америки горбатка-буйвол (*Stictoccephala bisonia*) может вредить культурным растениям. 2) (*Phoridae*), семейство двукрылых насекомых подотряда короткоусых круглошовных. Тело (0,5–8 мм в длину) тёмноокрашенное, с горбатой спинкой. Крылья прозрачные; у самок некоторых Г. они укорочены или отсутствуют. Распространены повсеместно. Более 3 тыс. видов, в России не менее 300. Мухи держатся на цветках во влажных местах, на разл. гниющих остатках, в норах и гнёздах, иногда в домах. Личинки развиваются в разлагающихся растит. и животных остатках, плодовых телах грибов, гнёздах термитов, муравьёв и ос; некоторые паразитируют в личинках божьих коровок, хищные поедают кладки яиц пауков и моллюсков. Личинки Г. – вредители грибов, культур насекомых при пром. и лабораторном разведении, зарегистрированы случаи возникновения тяжёлых заболеваний – [миазоз](#) кишечника человека, вызываемых ими. 3) Шипоноски (*Mordellidae*), семейство жуков

подотряда разноядных. Тело (1,5–12 мм в длину) сжато с боков, челновидное, покрыто волосками, брюшко вытянуто в шиповидное остриё. Окраска обычно чёрная, надкрылья часто со светлыми пятнами. Более 1500 видов (в России ок. 70). Распространены на всех материках (кроме Антарктиды), гл. обр. в тропиках и субтропиках. Жуки встречаются на цветках. Личинки развиваются в стеблях травянистых растений, гнилой древесине (напр., *Variimorda fasciata*) или древесных грибах. Некоторые виды – вредители подсолнечника и конопли.