

# ГОРИХВÓСТКИ

Авторы: В. М. Лоскот



Обыкновенная горихвостка.

ГОРИХВÓСТКИ (*Phoenicurus*), род певчих птиц сем. мухоловковых (ранее их относили к сем. дроздовых). Длина 11–18 см; масса 9–33 г; самки несколько мельче самцов. Телосложение стройное, ноги длинные. Клюв невысокий, с расширенным основанием; крылья притупленные; хвост сравнительно длинный, прямо срезанный. Окраска самцов яркая; включает чёрный, бурый, голубовато-серый, рыжий и белый цвета; самки серовато-или черновато-бурые; молодые птицы пятнистые. Своё назв. Г. получили за оранжево-рыжие надхвостье и хвост, которым птицы часто подрагивают. 11 видов; населяют гл. обр. леса и заросли кустарников в горах Сев.-Зап.

Африки и Юж. Евразии (встречаются даже в субнивальном поясе; в Гималаях – до выс. 5600 м); лишь немногие виды распространены в равнинных лесах. В России гнездятся 5 видов Г.: обыкновенная, или лысушка (*P. phoenicurus*), чернушка (*P. ochruros*), сибирская (*P. auroreus*), красноспинная (*P. erythronotus*) и краснобрюхая (*P. erythrogaster*); на Алтай залетает седоголовая Г. (*P. caeruleocephalus*). Перелётные птицы, в горах совершают вертикальные перемещения. Питаются членистоногими, осенью и зимой также ягодами. Моногамы. Гнёзда укрыты в дуплах, норах, трещинах скал или нишах под камнями. Обыкновенная Г. часто селится в постройках и охотно занимает искусств. гнездовья. В кладке 3–10 (обычно 4–7) яиц; насиживает самка 12–17 сут. Птенцов кормят оба родителя; гнездо они покидают через 12–19 (обычно 14–15) дней после вылупления.