



ГОРЛИЦЫ

Авторы: В. М. Лоскот



Обыкновенная горлица.

ГОРЛИЦЫ, общее название нескольких родов птиц (ок. 10) подсемейства типичных голубей (Columbinae) сем. голубиных. Для большинства Г. характерны небольшие размеры (длина 15–30 см), стройное, продолговатое тело с удлинённой шеей, длинный, часто закруглённый или клиновидный хвост. Наиболее богат видами (16) род обыкновенных Г. (*Streptopelia*). В окраске оперения этих Г. преобладают неяркие бурые, серые, охристые, розовые или голубые тона. На боках шеи обычно имеются тёмные пятна или чёрный полушейник. В токовом полёте самцов присутствует скольжение с широко раскрытыми крыльями и хвостом.

Воркование громкое, у ряда видов мелодичное. Населяют Евразию и Африку; в России гнездятся 4 вида: кольчатая (*S. decaocto*), обыкновенная (*S. turtur*), большая (*S. orientalis*) и малая (*S. senegalensis*) Г.; в Юго-Вост. Сибирь залетает короткохвостая Г. (*S. tranquebarica*). Наиболее широко распространена обыкновенная Г., населяющая лесные и культурные ландшафты Европ. части России (до 64°с. ш.) и Юго-Зап. Сибири. Кольчатая и малая Г. – синантропные виды, значительно расширившие ареал в 20 в. Показательно стремительное расселение кольчатой Г., начавшееся в 1930-х гг. с Балканского п-ова. Она заселила б. ч. Европы, проникнув на север до Фарерских о-вов, Скандинавского п-ова и Карелии, и продолжает расселяться на восток, появившись в Юж. Предуралье. Обладающая приятным воркованием дикая смеющаяся Г. (*S. roseogrisea*) одомашнена.