

ГРИБ-БАРА́Н

Авторы: Л. В. Гарибова



Трутовик зонтичный.

ГРИБ-БАРА́Н, название трёх видов базидиальных грибов, относящихся к разным родам и семействам; паразиты лиственных и хвойных пород, вызывающие гнили корней и оснований стволов деревьев. Трутовик листоватый, или курчавый (*Grifola frondosa*), сем. альбатрелловых (*Albatrellaceae*), достигает 80 см в диаметре и массы до 10 кг. Состоит из многочисл. плоских тонких волнистых полукруглых серо-оливковых шляпок (диаметр 4–10 см), сидящих на ветвящихся ножках, сливающихся в общее основание. Имеет сильный ореховый запах, съедобен. Распространён в лесах Евразии, Сев. Америки и Австралии, в России встречается в августе – сентябре в Европ. части, Сибири, на Дальнем Востоке. Растёт преим. у основания стволов лиственных деревьев. Трутовик зонтичный,

или разветвлённый (*Polyporus umbellatus*), сем. полипоровых (*Polyporaceae*), достигает 50 см в диаметре и массы до 4 кг. Состоит из многочисленных (до 100 и более) ветвистых белых ножек (у основания соединены в общую клубневидную ножку), на которых расположены округлые, светло-бурые шляпки диаметром 1–4 см и толщиной ок. 2 мм. Трубочки на нижней стороне шляпки белые, низбегающие на ножку. Имеет грибной запах с оттенком укропа, съедобен. Распространён в лесах Евразии и Сев. Америки; в России встречается и растёт там же, где трутовик листоватый. Спарассис курчавый, или грибная капуста (*Sparassis crispa*), сем. спарассиевых (*Sparassidaceae*) – округлый мясистый гриб (диаметр 15–30 см, масса до 10 кг). Состоит из плотной буроватой ножки и отходящих от неё многочисл. разветвлений, расширенных и сплюснутых в гладкие кремовые или охряно-жёлтые пластинки. Растёт на корнях, у основания стволов и на свежих пнях сосны, реже деревьев др. хвойных пород. Имеет приятный грибной запах, съедобен. Встречается в России там же, где первые два вида. Все 3 вида внесены в Красную книгу РФ.