

ЛАЗО́РЕВКА

Авторы: В. М. Лоскот



Лазоревка обыкновенная.

Фото И. Л. Каурова

ЛАЗО́РЕВКА обыкновенная (*Parus caeruleus*), птица сем. синицевых отр. воробьинообразных. Велика географич. изменчивость окраски и размеров, в связи с чем выделяют до 15 подвидов. Длина 11–14 см, масса обычно 9–11 г. Клюв и хвост короткие. Характерны ярко-голубые тона в окраске крыльев и хвоста, а также лазурно-голубое или синевато-чёрное пятно на темени, окружённое белой полосой. Бока головы белые; от клюва через глаз к зашейку проходит узкая чёрная полоса; синяя или синевато-чёрная перевязь на зашейке и боках шеи сливается с чёрным пятном на подбородке и горле. Спина зеленоватая; грудь и бока жёлтые, центр. часть брюшка белая; по середине груди и брюшка проходит размытая тёмная полоса, менее заметная у самок. Молодые особи тусклого желтовато-зелёного цвета, без тёмного горлового пятна. Л. населяет равнинные и горные леса в Европе (на север до 65–67° с. ш. в Скандинавии, до 58° с. ш. на Урале), на юге Зап. Сибири (на восток до Иртыша), Канарских о-вах, в Сев. Африке и нагорьях Передней Азии. На зиму птицы из сев. части ареала откочёвывают к югу. Предпочитает широколиственные и смешанные леса, особенно пойменные; обычна в садах и гор. парках. Питается гл. обр. мелкими насекомыми и пауками, поедает также семена и ягоды. Гнездится обычно в дуплах, охотно занимает искусств. гнездовья. Строит гнездо самка; кладку из 7–14 (до 16) яиц она насиживает 13–15 дней; самец кормит её в этот период. В юж. части ареала 2 выводка за сезон. Близкий вид, белая Л. (*P. cyanus*), населяет Евразию от Белоруссии до Приморья, на юг до Ср. Азии, Сев. Монголии и Китая.