



МОРДÓВНИК

Авторы: О. В. Чернева



Мордовник обыкновенный.

Фото М. Л. Зайцева

МОРДÓВНИК (*Echinops*), род растений сем. сложноцветных. Корневищные преим. многолетние травы с прямостоячими стеблями (выс. 0,5–2 м). Листья очередные, перисторассечённые, по краю колючезубчатые, реже цельные, нередко в прикорневых розетках. Многочисл. цветки с воронковидным сине-голубоватым или беловатым венчиком (одноцветковые корзинки) собраны на верхушке стебля и его ветвей в шаровидные головки. Плоды – семянки, длиной до 1 см, с хохолком. Ок. 125–130 видов, во внетропич. (исключая Арктику и значит. часть лесной зоны) и субтропич. регионах Евразии и Африки (сев.-вост. и вост.). В России ок. 17 видов, растущих на степных склонах, известняковых и меловых обнажениях, в т. ч. в горах, встречаются на залежах и вдоль дорог. Мн. виды – хорошие медоносы, некоторые – декоративны, культивируются в Зап. Европе. Плоды ряда видов (*М. обыкновенного* – *E. ritro* и *М. шароголового* – *E. sphaerosephalus*) содержат хинолиновые алкалоиды, основной из которых – эхинопсин (по действию сходен со [стрихнином](#)).