



МОРОДУ́НКА

Авторы: П. С. Томкович

МОРОДУ́НКА (*Xenus cinereus*), птица сем. бекасовых отр. ржанкообразных. Длина 22–27 см, размах крыльев 55–59 см, масса 50–120 г. Телосложение стройное. Ноги сравнительно короткие с перепонками в основании пальцев, жёлтые, оранжевые или серовато-зелёные. Клюв длинный, тонкий, буровато-чёрный, более светлый у основания, заметно изогнут вверх. Верх тела дымчато-серый с двумя чёрными полосами вдоль спины, низ белый, на шее спереди узкие продольные пестрины. Самцы и самки неразличимы. Молодые птицы более тёмные и рыжие сверху. В зимнем наряде верх серый, низ белый. Гнездится от Финляндии, Белоруссии и Украины до Чукотки, гл. обр. в лесной зоне возле заиленных речных берегов; область гнездования расширяется. Зимует на мор. побережьях Африки, Юж. Азии и Австралии. Осн. корм – насекомые, моллюски и ракообразные, включая мелких крабов. Моногам. Многие М. ежегодно возвращаются на участок прежнего гнездования. Гнездится на земле открыто, среди травы или в лесу, иногда в колониях крачек. Кладку из 4 яиц партнёры насиживают поочерёдно 23–24 дня, но птенцов водит преим. самец 15–17 дней. Птенцы кормятся самостоятельно.