



# ЛИВИСТО́НА

Авторы: И. В. Татанов



Ливистона южная.

Фото Tatiana Anderson

ЛИВИСТО́НА (*Livistona*), род пальм. Ствол (выс. до 35 м, диаметр 30–60 см) в верхней части или по всей длине покрыт волокнистыми остатками листовых влагалищ. Листья веерные (диаметр до 2 м) с длинными (до 3 м) колючими черешками. Соцветие метельчатое, сильно ветвистое, длиной до 2 м. Плоды – мясистые костянки. 34 вида, гл. обр. в тропиках Азии и в Австралии, на о. Новая Гвинея и Соломоновых о-вах, 1 вид – в сев.-вост. Африке и на юге Аравийского п-ова. Наибольшее видовое разнообразие представлено в Австралии (18 видов, из которых 16 эндемики). Листья Л. используют как кровельный материал, волокно листовых влагалищ – для изготовления плетёных изделий и щёток, твёрдую древесину – в столярном произ-ве. Молодые листья и почки Л. южной, или австралийской, капустной пальмы (*L. australis*), употребляют как овощ. Некоторые виды, особенно Л. южная, Л. круглолистная (*L. rotundifolia*) и Л. китайская (*L. chinensis*), разводятся как декоративные растения в садах и парках тропич. стран, высоко ценятся также в оранжереях и в комнатной культуре.