

ОРАНГУТА́НЫ

Авторы: А. О. Аверьянов



Суматранский орангутан.

Фото Greg Nume

ОРАНГУТА́НЫ (*Pongo*), род человекообразных обезьян; единственные совр. представители их азиатской ветви (подсемейство *Ponginae*). 2 вида: калимантанский О. (*P. pygmaeus*) и суматранский О. (*P. abelii*), обитающие соответственно на островах Калимантан и Суматра Малайского архипелага (Индонезия). В плейстоцене ареал О. распространялся до Юж. и Центр. Китая. Длина тела 1,2–1,5 (редко до 1,8) м. Масса самок 30–50 кг, самцов – 50–90 кг (в неволе до 140 кг и более). Самые крупные из ныне живущих древесных животных. Передние конечности длиннее, чем у наземных человекообразных обезьян (доходят до лодыжек), задние – короткие; отличаются также красновато-коричневой окраской шерсти. Волосной покров редкий, грива из длинных волос на голове и плечах. У взрослых самцов имеются усы и борода. Живут в дождевых тропич. лесах (в горах до 1500 м). Дневные животные. Пики активности приходятся на утренние и вечерние часы; в середине дня отдыхают. На ночь из веток и листьев строят большие гнёзда, которые обычно используются один раз. Иногда сооружают меньшие по размеру гнёзда и для дневного отдыха.

Передвигаются гл. обр. лазая по деревьям и перепрыгивая с ветки на ветку с помощью рук (брахиация). По земле перемещаются редко (в осн. чтобы добраться от одного дерева до другого), используя при этом все четыре конечности. В течение дня преодолевают расстояние до 1 км. Питаются преим. фруктами, среди которых преобладают плоды инжира и дуриана; сезонные перемещения обусловлены гл. обр. временем созревания плодов. Потребляют также др. части растения, насекомых, мелких позвоночных, птичьи яйца. Группа самок с детёнышами занимает участок площадью ок. 0,65 км². Взрослые самцы, как правило, живут поодиночке, на территории 2–6 км², включающей участки нескольких взрослых самок. Физиологич. половая зрелость у самок наступает примерно в 7 лет, но впервые приносят потомство они не раньше, чем в 12 лет. Самцы же приобретают необходимый для размножения социальный статус в 13–15 лет. Период между родами составляет 3–4 года. Беременность длится 8–9 мес. Обычно рождается 1 детёныш массой 1,5–2 кг. Он висит на груди матери в течение первого года жизни, иногда до 2,5 лет (кормление молоком прекращается по достижении 3,5 лет); до 7–8 лет находится под защитой матери. В неволе О. живут до 59 лет. По классификации Красной книги МСОП, суматранский О. находится в критич. состоянии, калимантанский – под угрозой исчезновения. Численность популяции первого вида оценивается в 6600 особей, второго – в 54500 особей. Гл. угрозу для О. представляет пром. вырубка лесов, приводящая к исчезновению естеств. среды их обитания.