



# ОЛÉНИ

Авторы: Н. А. Щипанов

ОЛÉНИ, оленевые, плотнорогие (Cervidae), семейство млекопитающих отр. парнокопытных. Известны с раннего миоцена. Выделяют неск. подсемейств (до 5) и ряд триб. Систематика до конца не устоялась. От 10 до 16 современных, в т. ч. олени (Cervus) и козули (Capreolus), и ок. 45 ископаемых родов. Размеры от небольших, размером с зайца – у пуду (Pudu), до средних, размером с крупную лошадь – у лосей (Alces). Длина тела 90–310 см, высота в холке 35–233 см, масса 7–825 кг. Сложение стройное, ноги тонкие, высокие. За исключением водяных О. (Hydroptes) и кабарги (Moschus) у самцов имеются рога, у северных оленей (Rangifer) рога есть также у самок. Они представляют собой ежегодно вырастающие и сбрасываемые костные образования, которые формируются на особых выростах (апофизах) лобных костей; у большинства О. они ветвятся. У оленя Давида (Elaphodus), мазамы (Mazama) и пуду рога с отростками, отходящими от осн. ствола (штанги). Растущий рог проходит последовательно соединительнотканную, хрящевую и костную стадии. В начале роста рога обильно пронизаны кровеносными сосудами, покрыты кожей с короткими волосами и называются *пантами*. В этот период их ткани содержат много биологически активных веществ. В основании рога формируется пояс с неровными краями (розетка), по которому происходит резорбция кости и будущее его отпадение. Окраска взрослых обычно однотонная, тёмная, иногда со светлыми пятнами (у более примитивных форм). У новорождённых и молодых О. окраска обычно пятнистая (у северного оленя однотонная). У мн. видов на задней стороне ляжек и под хвостом имеется белое пятно – «зеркало». Для волос О. характерна полая сердцевина. Желудок сложный, четырёхкамерный. Исходно О. были распространены на Америк. континенте, в Сев.-Зап. Африке, в Евразии, включая Малайский архипелаг. Интродуцированы в Австралии, на Новой Гвинее, Новой Зеландии, Мадагаскаре, Маврикии, о-вах Карибского бассейна и зап. части Тихого ок. Придерживаются лесов, в осн. разреженных, обитают на равнинах, в предгорьях и горах, заходят в лесостепь и на альпийские луга. Северный олень живёт в тундре и тайге. Растительоядные. Обычно животные держатся группами, иногда могут образовывать большие стада. Некоторые виды совершают сезонные миграции. Большинство полигамы. Характерны турниры самцов во время гона. В климатич. условиях с выраженной сезонностью гон приходится на осень – зиму. Длительность беременности 5–10 мес, в помёте 1 (редко 2) детёныш у крупных видов и 4–7 – у мелких видов. В местах исходного обитания – ценные охотничьи и декоративные (лань, барасинга и др.) животные, в местах акклиматизации наносят существенный урон естеств. экосистемам. Значит. ценность пантов обусловила развитие особой отрасли животноводства – пантового оленеводства. Из 55 видов О., включённых в Красный список МСОП, 24 находятся в угрожаемом положении или состояние их популяций вызывает тревогу, 2 вида вымерли в историч. время. См. также *Благородный олень*, *Пятнистый олень*, *Оленеводство*.

## Литература

Лит.: Cervidae // Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference / Ed. D. E. Wilson, D. M. Reeder. 3rd ed. Balt., 2005.