



ПА́МА-НЬЮ́НГА ЯЗЫ́КИ

Авторы: Ю. Б. Коряков, Я. Г. Тестелец

ПА́МА-НЬЮ́НГА ЯЗЫ́КИ (пама-ньюнгские языки), крупнейшая семья [австралийских языков](#). Распространена на б. ч. Австралии [кроме её северо-запада (п-ов Арнем-Ленд, плато Кимберли), части островов Торрессова пролива и о. Тасмания, где сосредоточены все языки др. автохтонных австрал. семей]. Назв. «пама-ньюнга» предложено К. Хейлом (США) и состоит из слов «рата» и «nyunga», первое из которых (или близкое к нему по звучанию) означает 'человек' в языках северо-восточной, а второе – в языках юго-зап. области распространения данной семьи.

Семья пама-ньюнга включает (по оценке на нач. 2010-х гг.) ок. 200 языков (вместе с вымершими). В ней выделяется св. 30 групп нижнего уровня, которые в соответствии с наиболее совр. классификацией семьи, принадлежащей К. Бауэрн и К. Аткинсону (2012), объединяются следующим образом. Зап. подсемья включает 4 ветви: юго-западную [группы пилбарская (18 языков), картуйская (5 языков), нюнгарская (11 языков) и мирнинская (2 языка)], пустынную [группы маррнгульская (3 языка), нгумпин-япская (10 языков), ватийская (18 языков) и яз. варумунгу], варлуварскую (нгарна; 5 языков) и йолнгульскую (10 языков). В центр. подсемье выделяются 2 ветви: одна включает тура-юрскую (8 языков) и арантийскую (7 языков) группы, другая – карнийскую (14 языков), ярлийскую (3 языка) и пакантийскую (2 языка). Сев. подсемья делится на 2 ветви: одна состоит из калкатунгской (2 языка) и маяпийской (6 языков) групп, другая (пама-марийская) включает 5 групп [марийскую (26 языков), паманскую (57 языков), дирбальскую (5–7 языков), западноторресскую (2 языка) и яланди-йитиньскую (4–6 языков)]. В юго-вост. подсемье выделяются 3 ветви: викторийская [нижнемуррейская (9 языков), гипслендская (6 языков), йотайотская (2 языка) и кулинийская (14 языков) группы], новоюжноуэльсская [юин-курийская (14 языков) и виратурская (3–5 языков) группы, яз. мурувари] и северобережная [турупальская (5 языков), пандялангская (5 языков), вака-кабийская (5 языков) и кумбайнгирская (2 языка) группы].

С учётом археологич. и генетич. данных прародина П.-н. я. локализуется на северо-востоке Австралии; разделение [праязыка](#) датируется предположительно 5–6-м тыс. до н. э. Гипотезы о внешних генетич. связях [напр., семья «макропама-ньюнга», включающая кунвинькуские языки (гунвинггу)] не доказаны.

Фонетич. и грамматич. особенности П.-н. я. типичны для австрал. языков.

Семья П.-н. я. идентифицирована К. Хейлом в нач. 1980-х гг.; в дальнейшем родство и историю П.-н. я. исследовали австрал. лингвисты Дж. О'Грейди, Б. Блейк, Н. Эванс, Р. Диксон, П. Макконвелл и др.

Литература

Лит.: Handbook of Australian languages. Amst., 1979–2000. Vol. 1–5; Studies in Comparative Pama-Nyungan. Canberra, 1990; Australian languages: classification and the comparative method. Amst.; Phil., 2004; Bower C., Atkinson Q. Computational phylogenetics and the internal structure of Pama-Nyungan // Language. 2012. Vol. 88. № 4.

